

Cystilac

Descriere: Cystilac este Aliment Dietetic pentru Scopuri Medicale Speciale. Cystilac este o pulbere nutritional completa, hipercalorica, imbogatita cu Vitamina A, Vitamina E si sodiu. Cystilac poate fi folosit ca sursa unica de nutritie a sugarilor cu fibroza chistica.

Indicații: Se administrează doar pe cale enterală. Trebuie folosit sub supraveghere medicală. Cystilac furnizeaza suport nutritional complet sugarilor sau suplimentarea dietei copiilor cu fibroza chistica.

Contraindicații: Nu se administrează parenteral.

Indicații de folosire: Formulele pentru sugari sub formă de pulbere nu sunt sterile și trebuie să fie pregatite doar înaintea administrării. Agitați formula înaintea folosirii. Formula nu trebuie încălzită mai mult de 15 minute înainte de a hrăni sugarul. Nu fierbeți formula și nu folosiți cuptorul cu microunde pentru prepararea sau încălzirea formulei.

Cantitatea necesara si dilutia formulei trebuie stabilite de medic si depinde de varsta, greutatea corporala si starea clinica a fiecarui pacient in parte. **Concentratia recomandata este de 20%.** O concentratie mai mica poate fi necesara initial, pana este obtinuta toleranta. Cystilac poate fi preparat pentru alimentare orala sau pe sonda prin adaugarea cantitatii de pulbere in apa si agitand viguros. Pentru a obtine 100ml formula, adaugati 4 masuri (4 x 5.5g) de Cystilac la 80 ml apa fiarta si racita.

Sanatatea copilului Dvs depinde de urmarirea atenta a sfaturilor pentru prepararea si administrarea formulei. Prepararea incorecta poate afecta sanatatea copilului.

Mod de preparare:

1. Se spală mâinile și se curăță zona unde se prepară formula. Sterilizați biberoanele și tetinele.
2. Fierbeți apa proaspătă timp de 5 minute și lasați-o să se răcească cel puțin 30 minute astfel încât să o simțiți caldă când picurați pe încheietura mâinii. Turnați cantitatea necesară de apă într-un biberon steril.
3. Umpleți măsura din cutie cu pulberea Cystilac și îndepărtați excesul cu lama unui cuțit curat. Nu apăsați pulberea în măsură. Folosiți doar măsura din cutie.
4. Adăugați măsurile de Cystilac prescrise în apa din biberon. Puneți capacul biberonului și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de alimentare, asigurați-vă că formula este la o temperatură potrivită prin picurarea câtorva picături pe încheietura mâinii.
5. Formula rămasă în biberon mai mult de o oră se aruncă. Formula nu trebuie reîncălzită în timpul hrănirii sugarului.

Depozitare : A se păstra într-un loc răcoros, uscat (5-25°C), ferit de razele soarelui. Odată deschisă cutia, folosiți pulberea in maxim o lună. Întotdeauna puneți capacul cutiei după utilizare. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. A se consuma înainte de: vezi ambalaj.

Ambalaj : Cutie metalica x 900g. Ambalat într-o atmosferă protectoare.

Producator: Nutricia GmbH, Erlangen, Germania. **Distribuitor:** S.C. Nutrient Solutions SRL.

Ingrediente : Proteine hidrolizate din **lapte** (zer, cazeina) (din **lapte** de vaca), sirop de glucoza, uleiuri de origine vegetala si animala, emulgator (E472(c), citrat trisodic, maltodextrina, citrat de magneziu, L-Leucina, fosfat de calciu dibazic, L-Fenilalanina, L-Tirozina, L-Glutamina, L-Acid Ascorbic, bitartrat de colina, clorura de potasiu, L-Cistina, L-Histidina, L-Metionina, L-Treonina, L-Valina, fosfat hidrogenat disodic, clorura de calciu, taurina, sulfat feros, m-inositol, sulfat de zinc, L-Carnitina, citrat tripotasic, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, DL- α tocoferil acetat, sulfat de magneziu, sulfat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidat de tiamina, riboflavină, Vitamina A acetat, acid folic, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, clorură de crom, selenit de sodiu, Vitamina K 1, D-biotină, Vitamina D3, ciancobalamină.

Informații nutriționale (conținut mediu)

	Unitatea de măsură	Per 100g	Per 100 ml* (22 g pulbere)
Valoare energetica	kcal/kJ	478/2003	105/441
Proteine	g	12.7	2.8
Carbohidrați	g	54.7	12.1
	Lactoza	g	4.9
Lipide	g	22.4	4.9
	MCT	g	1.23
Fibre	g	3.6	0.8
Vitamine			
Vitamina A	μ g-RE	640	141
Vitamina D3	μ g	7.3	1.6
Vitamina E	mg α TE	21	4.6
Vitamina K	μ g	45.4	10
Tiamina (B1)	mg	0.57	0.13
Riboflavina (B2)	mg	0.57	0.13
Niacina (B3)	mg	5.7	1.2
Acid pantotenic (B5)	mg	3.4	0.75
Vitamina B6	mg	0.5	0.11
Acid folic	μ g	54	12
Vitamina B12	μ g	0.9	0.2

Biotina	μg	9.1	2
Vitamina C	mg	50	11
Minerale si oligoelemente			
Na	mg	363	80
K	mg	382	84
Cl	mg	318	70
Ca	mg	308	68
P	mg	181	40
Mg	mg	50	11
Fe	mg	4.8	1.1
Zn	mg	3.2	0.7
Cu	μg	268	59
Mn	mg	0.2	0.05
F	μg	0	0
Mo	μg	7.3	1.6
Se	μg	9	2
Cr	μg	9	2
I	μg	64	14
Altele			
Colina	mg	82	18
m-inositol	mg	54	12
Carnitina	mg	7	1.5
Taurina	mg	27	6
Osmolaritate	mOmol/l	390-432	390-432

*la concentratia recomandata de 22%